


TOP FRONT

FPO Code 128C

6

FPO Code 128C

Refresh® Eye Allergy Relief 

antazoline phosphate 0.51 %
naphazoline hydrochloride 0.051 %
sterile ophthalmic solution
ANTIHISTAMINE / DECONGESTANT

CONTAINS: Medicinal Ingredients: Antazoline phosphate 0.51 % (w/v), naphazoline hydrochloride 0.051 % (w/v). Non medicinal ingredients: benzalkonium chloride 0.004 % (as preservative), edetate disodium, Liquifilm® (polyvinyl alcohol), povidone, sodium acetate and sodium chloride.

ACTIONS: Refresh® Eye Allergy Relief combines the effects of the antihistamine, antazoline and the decongestant, naphazoline, which constricts blood vessels.

INDICATIONS: For use in the temporary symptomatic relief of tearing, redness, swelling and itching due to eye allergies.

CONTRAINDICATIONS: Known allergies to a component of this medication; patients with glaucoma; not for use in children unless under medical advice.

WARNINGS: A severe increase in blood pressure may ensue in patients under MAO inhibitor medication from use of a sympathomimetic drug. Central nervous system depression leading to a coma and marked reduction in body temperature may occur in children, especially infants. Do not touch dropper tip to any surface as this may contaminate solution. Replace cap after using. Consult a physician before using if you have high blood pressure, heart problems, diabetes mellitus, thyroid problems or if you are taking any other prescription or non-prescription (over-the-counter) medication.

ADVERSE REACTIONS: Pupillary dilation with increase in intraocular pressure, high blood pressure, heart problems, high blood sugar. Drowsiness may be experienced in some patients. Accidental ingestion (especially in children), may cause marked sedation requiring emergency treatment.

ADULT DOSAGE: 1 to 2 drops in each eye every three to four hours or less frequently.

STORAGE: Protect from light. Keep bottle tightly closed. Keep out of reach of children. Store at 15°C to 25°C.


HOW SUPPLIED: In 15 mL plastic dropper bottles.

February 2009

ALLERGAN PHARMACEUTICALS
Div. of ALLERGAN Inc.,
Markham, Ontario, Canada, L6G 0B5
Made in Ireland

72146EC11A

TOP BACK

Refresh^{MD} Eye Allergy Relief 

phosphate d'antazoline à 0,51 %
chlorhydrate de naphazoline à 0,051 %
gouttes oculaires stériles
ANTIHISTAMINIQUE ET DÉCONGESTIONNANT

INGRÉDIENTS : Ingrédients médicinaux : phosphate d'antazoline à 0,51 % (p/v), chlorhydrate de naphazoline à 0,051 % (p/v). Ingrédients non médicinaux : chlorure de benzalkonium à 0,004 % (comme agent de conservation), EDTA de disodium, Liquifilm® (alcool polyvinylique), polyvidone, acétate de sodium et chlorure de sodium.

MODE D'ACTION : Refresh^{MD} Eye Allergy Relief associe les effets d'un antihistaminique, l'antazoline, et d'un décongestionnant, la naphazoline, qui provoque la constriction des vaisseaux sanguins.

INDICATIONS : Pour le soulagement temporaire des symptômes du larmoiement, de la rougeur oculaire, de l'enflure et de l'irritation des yeux causés par les allergies.

CONTRE-INDICATIONS : Allergies connues à un ingrédient de ce médicament; patients atteints de glaucome; contre-indiqué chez l'enfant, sauf sur l'avis d'un médecin.

MISES EN GARDE : L'utilisation d'un médicament sympathomimétique peut entraîner une augmentation grave de la tension artérielle chez les patients traités par un inhibiteur de la monoamine-oxydase (MAO). Une dépression du système nerveux central, menant à un coma et à une baisse marquée de la température corporelle, peut survenir chez l'enfant, en particulier chez le nourrisson. Pour prévenir la contamination de la solution, évitez que l'embout compte-gouttes ne soit en contact avec une surface. Refermez le capuchon après l'utilisation. Consultez un médecin avant d'utiliser ce produit si vous êtes atteint d'hypertension, de troubles cardiaques, de diabète sucré, de troubles de la glande thyroïde ou si vous prenez un autre médicament disponible sur ordonnance ou en vente libre.

EFFETS INDÉSIRABLES : Il peut se produire une dilatation de la pupille accompagnée d'une pression intra-oculaire, d'hypertension, de troubles cardiaques et d'un taux élevé de sucre sanguin. Certains patients peuvent manifester de la somnolence. L'ingestion accidentelle du médicament (en particulier chez l'enfant) peut provoquer une sédation marquée nécessitant un traitement d'urgence.

Posologie chez l'adulte : 1 à 2 gouttes dans chaque œil toutes les trois ou quatre heures ou à intervalles moins fréquents.

ENTREPOSAGE : Conservez à l'abri de la lumière. Refermez fermement le capuchon après l'utilisation. Gardez hors de la portée des enfants. Entreposer entre 15°C et 25°C.

PRÉSENTATION : Flacon compte-gouttes en plastique de 15 mL.

Février 2009

ALLERGAN PHARMACEUTICALS
Une Division de ALLERGAN Inc.
Markham, Ontario, Canada, L6G 0B5
Fabriqué en Irlande

72146EC11A

INSERT, TYPE B2,
PENCIL FOLD,
114MM X 220MM,
FOLDED TO 114MM X 23MM
0106501

- PART #: 72146EC11A
- DRAWING #: 0106501
- V-CODE #: N/A
- ARTWORK IS ACTUAL SIZE
- DROP TEMPLATE AND NOTES BEFORE PROCESSING